

Серый журавль

Grus grus (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся и перелётный, легко уязвимый вид, имеющий особое эстетическое и символическое значение.





Распространение: Евразия от Скандинавии, Дании, долины Эльбы к востоку до долины Индигирки и охотского побережья. В России — на большей части страны южнее лесотундры, отсутствует в южных безлесных районах и на Дальнем Востоке. Южная граница ареала в XX столетии в связи с массовым осушением болот, вырубкой лесов и освоением территорий отступила на сотни километров к северу (в долине Волги — примерно до 48-й параллели), ареал приобрел пятнистый характер. Во многих странах Европы серый журавль вообще исчез (1). В Ульяновской области гнездится на глухих лесных болотах и заболоченных лесных долинах рек в Сурском, Инзенском, Карсунском, Базарносызганском, Вешкаймском, Барышском, Майнском, Кузоватовском, Николаевском, Новомалыклинском, Мелекесском и Старомайнском районах. Совсем не гнездятся журавли в южных районах области, в районах, примыкающих к областному центру, в ряде безлесных мест с преобладанием полевого ландшафта (юг Заволжья, открытые ландшафты вдоль р. Свияги, в Тереньгульском районе). В период сезонных миграций встречается в открытых ландшафтах по всей области. Имеется несколько мест традиционных предотлётных скоплений журавлей (см. ниже).

Особенности биологии: Очень крупная (весом до шести килограммов и размахом крыльев до 2,4 м) красивая птица с длинными ногами и шеей (рост до 1,25 м). Журавль чрезвычайно скрытен и осторожен, особенно в период размножения. Гнездится на малопосещаемых верховых и травяных болотах, сильно заболоченных поймах рек, заросших древесно-кустарниковой растительностью и обширных заболоченных котловинах больших озёр. Предпочитает участки топких переувлажнённых кочкарниковых болот с высокой осокой, густым ольшанником с вкраплениями угнетённых осинников и березняков. В условиях нашего региона на отдельных крупных болотах журавли могут гнездиться группами до пяти пар. Гнездо располагается на земле или кочке в труднодоступном месте часто прямо среди воды, и представляет собой платформу из растительного материала. В кладке два яйца. Половой зрелости журавли достигают только в 4-6 лет, пары постоянные. В питании преобладают различные части растений: побеги, корневища, семена, ягоды, а также насекомые и другие беспозвоночные, реже — лягушки, мышевидные грызуны и мелкие рыбки. Линяют журавли на крупных болотах, в т. ч. и на тех, на которых гнездятся. Перед отлётом образуют скопления и вылетают кормиться на убранные зерновые и картофельные поля, из года в год останавливаясь в одних и тех же излюбленных местах (1). Зимуют в Африке, в Иране и на юге Азии.

Численность: Все орнитологи XIX и начала XX века, работавшие в Симбирской губернии, отмечают, что серый журавль был нередок или довольно обычен на гнездовании (2-4). В 1958 и 1978 г.г. Центральной орнитологической станцией Окского государственного заповедника были проведены учёты этого вида в ряде областей и республик средней полосы России (5,6)